

Absender: Recordati Pharma – Business Unit Orthopädie

Rundschreiben: Infoblatt LMIV Anforderung

www.recordati.de

 Betreff: **Recosyn® Tabletten**  
 Nahrungsergänzungsmittel  
 PZN 06586840

 28.11.2014  
 Tel: +49 (0)731 7047-173  
 Fax: +49 (0)731 7047-44 173  
 steinhauser.c@recordati.de

**Deklaration gemäß LMIV Art. 14**

<b>Verkehrsbezeichnung</b>	<b>Recosyn® Tabletten</b>
<b>Zutaten</b>	<p>Glucosaminsulfat-Dikaliumchlorid (aus Kriebstieren), Calciumcarbonat, Chondroitinsulfat-Natrium (aus Fisch), Füllstoff: Cellulose, Überzugsmittel: Gummi arabicum, Füllstoff: vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Ascorbinsäure, Trennmittel: Mono- und Diglyceride der Speisefettsäuren, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Mangansulfat, Vitamin D3 (Cholecalciferol, Gelatine, Saccharose, Maisstärke, teilweise gehärtetes Sojaöl), Festigungsmittel: Siliciumdioxid, Füllstoff: Hydroxypropylmethylcellulose, Farbstoff: Titandioxid, Karmin E120, Eisenoxide und -hydroxide, Überzugsmittel: Schellack, Talkum, Polysorbat 80, Olivenöl, Trägerstoff: Polyvinylpyrrolidon.</p> <p>Glutenfrei. Laktosefrei. Purinfrei.</p>
<b>Einzeleinheit</b>	1 Packung enthält 60 Filmtabletten.
<b>Nährwertdeklaration</b>	Unter Berücksichtigung der Verzehrempfehlung werden pro Tag 1.000 mg Glucosamin, 350 mg Chondroitinsulfat, 67 mg Vitamin C, 1,7 µg Vitamin D3, 200 mg Kalzium, 2 mg Mangan eingenommen.
<b>Unternehmer</b>	Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Straße 55, 89075 Ulm
<b>Sonstige Informationen</b>	<p>Empfindliche Personen: selten Magen-Darm-Beschwerden. Vorsicht bei bestehender Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Schalentiere, Rohstoff Glucosamin wird aus deren Chitin-Panzern gewonnen. Schwangerschaft u. Stillzeit: Glucosamin-Einnahme abgeraten, da bisher keine Erfahrungen für sichere Anwendung. Diabetes oder eingeschränkte Glucosetoleranz: Überwachung des Blutzuckerspiegels u. des Insulinbedarfs. Verbraucher, mit Cumarin-Antikoagulantien: Recosyn® Tabletten nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, da über eine Erhöhung/Erniedrigung der INR u. über das Auftreten von Blutungen bei gleichzeitiger Einnahme von Cumarin-Antikoagulantien (Warfarin und Acenocumarol) u. Glucosamin berichtet wurde. Blutgerinnung sorgfältig überwachen.</p>
<b>Verzehrempfehlung</b>	2-mal täglich eine Filmtablette unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit zu den Mahlzeiten einnehmen.